

ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

«Гумат+7 үр тариа-тосны ургамалын» (10%-ийн баяжуулсан шингэн)

	1т үр ба 1 га тал- байд зарцуулах 10% баяжуулсан шингэний зарцуу- лах тун, литр	Үрийг боловсруулах ба таримлыг шүрших шингэний хэмжээ	Хэрэглэх арга, хугацаа, онцлог
Үр тариа	1,0-1,8л	10 л/ 1т үрэнд	Үрийг тариалахын өмнө хягас хуурай аргаар боловсруулна. Дивлэвдтэй болон түүнтэй нжил үр ариутгагчтай хамт хэрэглэж болно.
	1,0-1,3л	200-300 л/га	Үндэсний бүс бордолтыг гербицидтэй хамт хийнэ. Эхний шүршилт- бутлалтын сүүлчээр, 2 дахь шүршилт- түрүүлэлтийн эхэнд хийнэ. Пестицидийн тунг 10%-иар бууруулж болно.
Наранцог	0,5л	10 л/ 1т үрэнд	Үрийг тариалахын өмнө хягас хуурай аргаар боловсруулна. Үр ариутгагчтай хамт хэрэглэж болно.
	0,6-0,8л	200-300 л/ га	Эхний боловсруулалтыг цухуйх үед, 2 дахь боловсруулалтыг 3-4 хос навчтай үед, 3-р боловсруулалтыг 6-8 хос навчтай үед хийнэ.
Эрхэнэ шим	0,01л	10-20 л /1т үрэнд	Үрийг тариалахын өмнө хягас хуурай аргаар боловсруулна. Үр ариутгагчтай хамт хэрэглэж болно.
	1,0-1,2л	200-300 л/га	Үндэсний бүс бордолт: 2 удаа хийнэ. Эхний бордолтыг - 5-6 навчтай байхад, 2 дахь боловсруулалтыг - залуа гарах үед хийнэ
Томс	0,4-0,5л	20 л/ 1т буцлуунд	Буцлуунд тариалахын өмнө гумат ба пестицидийн холимогийг хэрэглэж болно.
	0,5-0,8 л	200-300 л/ га	Бутыг бордох: Томсний бутыг 4 навчтай байх үеэс эхлэн 10-15 хоногт нэг удаа цэвэрлэлт хүртэл бордоно.
Маалинга	0,7-0,9 л	10 л/1т үрэнд	Үрийг тариалахын өмнө хягас хуурай аргаар боловсруулна. Үр ариутгагчтай хамт хэрэглэж болно.
	0,6-0,8 л	200-300 л/га	Тарималд 2 удаа боловсруулалт хийнэ: Эхний боловсруулалт -«сезон» үе шатны эхэнд, 2 дахь боловсруулалтыг бундуйлалтын эхэнд хийнэ. Пестицидийг гуматтай хослуулж хэрэглэж болно.
Лууван	0,7-0,8 л/га	200-300 л/га	Таримлыг ургамал ургалтын хугацаанд 10-14 хоногт 1 удаагийн давтамжтай шүршинэ.
Байцаа	0,4-0,7 л/га	200-300л/га	Таримлыг 7 хоногт 1 удаагийн давтамжтай усална.
Хүрэн манжин	0,5-0,8 л/га	200-300 л/га	Таримлыг бордох: 1-р боловсруулалт 4-5 жинхэнэ навчтай үед; 2-р боловсруулалт 1-р боловсруулалтаас 10-15 хоногийн дараа; 3-р боловсруулалт 7-р сарын сүүлч 8-р сарын эхний 10 хоногт.
Вандуй	0,1 -0,2л	10-20л/1 т үрэнд	Үрийг тариалахын өмнө хягас хуурай аргаар боловсруулна. Үр ариутгагчтай хамт хэрэглэж болно.
	0,5-0,6 л/га	200-300 л/га	Үндэсний бүс бордолтыг гуматтар тарималд хэрэглэхээр төлөвлөсөн пестицидтэй хослуулж хийнэ.

Шар буурцаг	0,5– 0,8 л	10 л/1 т үрэнд	Үрийг тариалахын өмнө хялс хуурай аргаар боловсруулна. Үр ариутгагчтай хамт хэрэглэж болно.
	0,6-0,8 л	200-300 л/га	Үндэсний бүс бордолтыг 3 удаа явуулна: 1-р боловсруулалт 3-5 навчтай байхад, 2-р боловсруулалт 5-6 навчтай байхад, 3-р боловсруулалт доод эрэмбийн буурцаг боловсруулж эхлэхийн өмнө
Өргөст хэмх ба улаан дооль	0,5-0,7 л/га	200-300 л/га	Үрсээг суулгах үед болон суулгаснаас хойш 2 долоо хоног тутамд нэг удаа гуматын уусмалаар зөвлөсөн тунгаар усална. Хэрэв доолийн иш бүлүүрч жэлбэл (доолийн иш, навч бүлүүрч байдал ажиглагддаг) зөвхөн баг цэврийг шүршинэ.
Гоньд, яншуй, салатны ургамал, сонгино ба бусад	0,3-0,4 л	200-300 л/га	Таримлыг ургамал ургалтын хугацаанд 2-3 долоо хоногийн зайтай хэд хэдэн удаа усална.
Таримал цэцэг	0,01 л	10 л(100-500) суулгац	Суулгац ба мөчрийг тариалахын өмнө боловсруулах: Суулгацын үндэсний систем болон мөчрийн доод хэсгийг гуматын уусмалд 12-18 цаг дүрнэ.
	0,1 л -ийг 100 литр усанд	2-5 л/м ²	Үндэслэсэн ургамлыг 10-12 хоногт нэг удаа усална.
Модлог ба бутлаг ургамал	0,5 л -ийг 1000 литр усанд	(0,5-10) литр нэг суулгацанд	Суулгацын үндэсний системийг суулгахын өмнө боловсруулах: Гуматын уусмалд суулгацын үндэсний хулуучи хүртэл дүрнэ 18-24 цагийн турш байгана.
	0,5 л -ийг 1000 литр усанд	5-10 л/м ³	Таримлыг борлох: Суулгацыг суулгасны дараа гуматын уусмалаар шууд усална. Дараа нь 12-14 хоногийн зайтай 2 удаа усална. Хэрэв ургамлыг намар суулгаж байгаа бол зөвхөн 2 удаа гуматаар усална: хавийхнийг суулгах үед, 2 дахийг тогтвортой хүйтрэхээс 10-14 хоногийн өмнө шийнэ.
	0,1 л нь 100 л	1 л/1 бутанд 2-3 л/1 модонд	Бие дүйцэн ургамлын үндэсний бүс бордолт: 1-р боловсруулалт – нахиа эрчимтэй ургах үед, 2-р боловсруулалт – оройн нахиа ургах үед, 3-р боловсруулалт – үр цутгах үед, 4-р боловсруулалт – намар, цэцэг усалгаа хийх үед буюу тогтвортой хүйтрэхээс 2 долоо хоногоос өмнө.
Нуга ба бэлчээр	2-3 л	1000 л/га	Өвсийг ургалтын хугацаанд хэд хэдэн удаа шүршинэ: Ургалтын хугацааны эхэнд, мал бэлчээхээс ба хадхлас 10-14 өмнө, мал бэлчээж дууссаны дараа ба хадсаны дараа шууд. Гуматыг эрдэс бордоотой хослуулж хэрэглэж болно.
Рапе	0,7-1,0л/т	10 л/т	Үрийг тариалахын өмнө хялс хуурай аргаар боловсруулна. Үр ариутгагчтай хамт хэрэглэж болно. Эхний боловсруулалтыг цухууих үед, 2 дахь боловсруулалтыг 3-4 хос навчтай үед, 3-р боловсруулалтыг 6-8 хос навчтай үед хийнэ.
	0,7-1,0л/га	100-400 л/га	



2017 оны гантай жилд «Гумат+7 үр тариатосны ургамалын» нийлмэл шим бордоо улаан буудайнд нөлөөлсөн байдал. Орхон аймэг, Жаргалант сум, Бүтсийн ундрага ХХК-и тариан талбай.

ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР «ГУМЭЛ ЛЮКС» (10%-ийн баяжуулсан шингэн)

ТАРИМАЛ	1т үр ба 1 га тал- байд зарцуулах 10% баяжуулсан шингэний зарцуу- лах тун, литр	Үрийг боловсруулах ба таримлыг шүрших шингэний хэмжээ	Хэрэглэх арга, хугацаа, онцлог
Үр тариа	2,5 л	10 л / 1т үрэнд	Үрийг тариалахын өмнө хягас хуурай аргаар боловсруулна. Дивидендтэй болон түүнтэй нэлэл үр ариутгагчтай хамт хэрэглэж болно.
	1,3-1,5л	200-300 л/га	Үндэсний бүс бордолтыг гербицидтэй хамт хийнэ. Эхний шүршилт- бутлалтын сүүлчээр, 2 дахь шүршилт- гүрүүтэлтийн эхэнд хийнэ. Пестицидийн тунг 10%-иар бууруулж болно.
Наранцогт	0,5л	10 л / 1т үрэнд	Үрийг тариалахын өмнө хягас хуурай аргаар боловсруулна. Үр ариутгагчтай хамт хэрэглэж болно.
	0,6-0,8л	200-300 л / 1га	Эхний боловсруулалтыг цухуйх үед, 2 дахь боловсруулалтыг 3-4 хос навчтай үед, 3-р боловсруулалтыг 6-8 хос навчтай үед хийнэ.
Эрдэнэ шиш	0,4л	10 л / 1т үрэнд	Үрийг тариалахын өмнө хягас хуурай аргаар боловсруулна. Үр ариутгагчтай хамт хэрэглэж болно.
	1,2л	300 л/га	Үндэсний бүс бордолт: 2 удаа хийнэ. Эхний бордолтыг - 5-6 навчтай байхад, 2 дахь боловсруулалтыг - залла гарах үед хийнэ
Төмс	0,5л	10 л / 1т булцуунд	Булцуунд тариалахын өмнө гумат ба пестицидийн хольцыг хэрэглэж болно.
	0,5-0,7л	300-400 л / га	Бутыг бордох: Төмсний бутыг 4 навчтай байх үеэс эхлэн 10-15 хоногт нэг удаа цэцэглэлт хүртэл бордоно.
Маалинга	0,7-0,9 л	10 л / 1т үрэнд	Үрийг тариалахын өмнө хягас хуурай аргаар боловсруулна. Үр ариутгагчтай хамт хэрэглэж болно.
	0,6-0,8 л	200-300 л/га	Тарималд 2 удаа боловсруулалт хийнэ: Эхний боловсруулалт «селек» үе шатны эхэнд, 2 дахь боловсруулалтыг буцдуйлалтын эхэнд хийнэ. Пестицидийг гуматтай хослуулж хэрэглэж болно.
Лууван	0,7-0,8 л/га	300 л/га	Таримлыг ургамал ургалтын хугацаанд 10-14 хоногт 1 удаагийн давтамжтай шүршинэ.
Байцаа	0,7 -0,8л/га	300	Таримлыг 7 хоногт 1 удаагийн давтамжтай усална.
Хүрэн манжин	0,7-0,8 л/га	300 л/га	Таримлыг бордох: 1-р боловсруулалт 4-5 жижгэнэ навчтай үед, 2-р боловсруулалт 1-р боловсруулалтаас 10-15 хоногийн дараа; 3-р боловсруулалт 7-р сарын сүүлч 8-р сарын эхний 10 хоногт.
Вандуй	0,4 -0,5л	10л/1 т үрэнд	Үрийг тариалахын өмнө хягас хуурай аргаар боловсруулна. Үр ариутгагчтай хамт хэрэглэж болно.
	0,7-0,8 л/га	300 л/га	Үндэсний бүс бордолтыг гуматтар тарималд хэрэглэхээр төлөвлөсөн пестицидтэй хослуулж хийнэ.

Шар буурцаг	0,7–0,8 л	10 л/1 т үрэнд	Үрийг тариалахын өмнө хагас хуурай аргаар боловсруулна. Үр ариутгагчтай хамт хэрэглэж болно.
	0,7-0,8 л	300 л/га	Үндэсний бүс бордолтыг 3 удаа явуулна: 1-р боловсруулалт 3-5 нэгтэй байхад, 2-р боловсруулалт 5-6 нэгтэй байхад, 3-р боловсруулалт доод эрэмбийн буурцаг боловсруулж эхлэхийн өмнө
Өргөст хэмх ба улаан дооль	0,7-0,8 л/га	100-300 л/га	Үрсэлг суулгах үед болон суулгаснаас хойш 2 долоо хоног тутамд нэг удаа гуматын уусмалаар зөвлөсөн тунгаар усална. Хэрэв доолийн иш бүлүүрч жэлбэл (доолийн иш, нагч бүлүүрч байдал ажиглагддаг) зөвхөн баг цэврийг шүршинэ.
Гоньд, яншуй, салатны ургамал, сонгино ба бусад	0,3-0,4 л	100-300 л/га	Таримлыг ургамал ургалтын хугацаанд 2-3 долоо хоногийн зайтай хэд хэдэн удаа усална.
Таримал цэнэг	0,01 л	10 л(100-500) суулгац	Суулгац ба мөчрийг тариалахын өмнө боловсруулах: Суулгацын үндэсний систем болон мөчрийн доод хэсгийг гуматын уусмалд 12-18 цаг дүрнэ.
	0,1 л -ийг 100 литр усанд	2-5 л/м ²	Үндэслэсэн ургамлыг 10-12 хоногт нэг удаа усална.
Модлог ба бутлаг ургамал	0,5 л -ийг 1000 литр усанд	(0,5-10) литр нэг суулгацанд	Суулгацын үндэсний системийг суулгахын өмнө боловсруулах: Гуматын уусмалд суулгацын үндэсний хулуучи хүртэл дүрнэ 18-24 цагийн турш байгана.
	0,5 л -ийг 1000 литр усанд	5-10 л/м ³	Таримлыг борлох: Суулгацыг суулгасны дараа гуматын уусмалаар шууд усална. Дараа нь 12-14 хоногийн зайтай 2 удаа усална. Хэрэв ургамлыг намар суулгаж байгаа бол зөвхөн 2 удаа гуматаар усална: хавийнхийг суулгах үед, 2 дахийг тогтвортой хүйтрэхээс 10-14 хоногийн өмнө шийнэ.
	0,1 л нь 100 л	1 л/1 бутанд 2-3 л/1 модонд	Бие дүйцэж ургамлын үндэсний бүс бордолт: 1-р боловсруулалт – нахиа эрчимтэй ургах үед, 2-р боловсруулалт – оройн нахиа ургах үед, 3-р боловсруулалт – үр цутгах үед, 4-р боловсруулалт – намар, цэнэг усалгаа хийх үед буюу тогтвортой хүйтрэхээс 2 долоо хоногоос өмнө.
Нуга ба бэлчээр	2-3 л	1000 л/га	Өвсийг ургалтын хугацаанд хэд хэдэн удаа шүршинэ: Ургалтын хугацааны эхэнд, мал бэлчээхээс ба хадхлас 10-14 өмнө, мал бэлчээж дууссаны дараа ба хадхсаны дараа шууд. Гуматыг эрдэс бордоотой хослуулж хэрэглэж болно.
Рапе	0,7-1,0 л/т 0,7-1,0 л/га	10 л/т 100-400 л/га	Үрийг тариалахын өмнө хагас хуурай аргаар боловсруулна. Үр ариутгагчтай хамт хэрэглэж болно. Эхний боловсруулалтыг цухуйх үед, 2 дахь боловсруулалтыг 3-4 хос нэгтэй үед, 3-р боловсруулалтыг 6-8 хос нэгтэй үед хийнэ.



2017 оны гантай жилд «Гүмэл доок» нийлмэл шим бордоо улаан буудайнд нөлөөлсөн байдал.
Орхон аймаг, Жаргалант сум, Бүтлийн ундрага ХХК-н тариан талбай.